

## PATIENTINFORMATION

### **Operation for nedgroet storetånegl.**

#### Årsag til operation:

Hvis kanten af neglen vokser ned i huden og bløddelene, vil der nemt komme betændelse. Nogle negle er meget krumme på tværs og har derfor større tendens til at give betændelse. Specielt er der risiko, hvis neglen klippes kort. Ofte kan man få tilstanden til at gå i ro ved hjælp af bøjlebehandling og anden behandling hos en fodterapeut. Hvis der alligevel bliver ved med at være betændelse, eller hvis betændelsen kommer igen flere gange, vil det være rimeligt at foretage operation.

#### Operationen:

Foretages i lokalbedøvelse. Det er en såkaldt kileoperation, hvor der i den betændte side af neglen fjernes en kile på ca. 4 mm af neglen og det negledannende væv samt den tilstødende og betændte del af neglevolden. Hvis der er betændelse ved begge sider af neglen, laves der kileoperation på begge sider. Hvis neglen er undermineret af betændelse, skal den fjernes samtidig (den vil vokse ud igen på 3-5 måneder). Såret syes sammen med nylontråd. Der lægges forbindelse på tåen.

#### Efterbehandling:

Forbindingen skal skiftes efter 1-2 dage og i øvrigt ved behov.

Trådene fjernes efter 10 dage hos egen læge.

Hvis der skønnes at være behov, skal der tages Penicillin de første dage efter operationen.

#### Forventet resultat:

I de fleste tilfælde vil betændelsen forsvinde, og neglen vil kunne fungere normalt igen, lidt smallere end før.

#### Risici:

Betændelsen kan komme igen, især hvis neglen bliver klippet for kort.

Der kan vokse et "neglehorn" ud ved siden af neglen, hvis der er celler, der begynder at danne neglevæv.

Juni 2007

Fodankelsektoren

Ortopædkirurgisk afdeling

HorsensRegionshospital